

GUIA ABORTO

(12 PASTILLAS)

MISOPROSTOL



CONSIDERACIONES PARA UN ABORTO CON PASTILLAS

MISOPROSTOL es un medicamento utilizado tanto en el area ginecologica para inducir partos y abortos, como tambien ayuda a tratar ulceras y problemas gastrointestinales

El aborto con misoprostol es uno de los métodos mas seguros que existe, el cual no pone en riesgo la salud de la mujer en comparacion con procedimientos quirurjicos logra una eficiencia de mas de 98% de los casos, se debe usar UNICAMENTE en embarazos menores a 12 semanas de gestacion. el misoprostol en la sangre provoca contracciones uterinas y dilatacion cervical estas acciones ayudan a interrumpir el embarazo



INTERRUPCION SEGURA DEL EMBARAZO




(CYTOTEC 200MG MISOPROSTOL)

- SE REQUIERE EN TOTAL 12 PASTILLAS 200MG MISOPROSTOL
- EL MEDICAMENTO DEBE CONSEGUIRLO SELLADO Y ORIGINAL
- LA MARCA CYTOTEC ES UNA PASTILLA HEXAGONAL Y TIENE LA INSCRIPCION 1461

INDICACIONES

- se puede realizar de dos formas una via es sublingual o también puede ser de forma vaginal. En este indicaremos el uso sublingual.
- El uso sublingual consiste en aplicar 4 pastillas debajo de la lengua y esperar media hora con la boca cerrada a que se disuelvan.
- Pasada las 3 horas se repite el proceso con 4 pastillas sublingual.
- 3 horas despues se vuelve a repetir el proceso con la ultima dosis.



IMPORTANTE



- Si después de 24 horas no hay indicios de sangrado es importante realizar una ecografía y descartar un embarazo ectópico, en caso de no tener anomalía se debe repetir el proceso hasta que funcione, debe esperar mínimo 72 horas.
- La administración debe ser por una sola vía si comienza a hacerlo sublingual todas deben realizarse de la misma forma, cada dosis debe ser de 800 mg. no puede ser menos ni más.
- Debe repetir el proceso cada 3 horas respetando el horario en el cual se comienza si por ejemplo comienza a las 10 am, la siguiente dosis será a las 13 pm y la tercera dosis a las 16 pm.
- Media hora antes de iniciar no debe comer ni tomar líquidos. durante el día puede comer liviano evitando grasas saturadas, embutidos y productos lácteos.
- Hay abortos que pueden fallar debido a una aplicación incorrecta o dosis muy baja a la recomendada. realizar todo como corresponde

SINTOMAS




- Entre 30 minutos a 4 horas despues del primer uso comenzara a sentir sangrado y colicos mas fuertes que en una menstruacion normal, puede ser acompañado por nauseas escalofrios o fiebre.
- Durante el sangrado comenzaras a eliminar coágulos mas grandes y entre ese sangrado explusara el tejido gestacional
- El sangrado puede durar desde 7 a 20 dias despues posterior al aborto.
- Es normal sentir fiebre nauseas colicos escalofrios diarrea, estos sintomas solo duran las primeras 24 horas puede tomar ibuprofeno de 400 mg como analgesico.

POST ABORTO


- Pasada las primeras 24 horas, o al proximo dia se recomienda tomar amoxicilina o cafadroxilo 500 mg cada 8 horas por 5 dias para evitar una infeccion despues del proceso
- Si continua con colicos, o un leve dolor abdominal puede tomar ibuprofeno de 600 mg cada 8 horas por 3 dias maximo.
- La ecografía vaginal es la unica forma de saber si el proceso fue efectivo, puede realizarla despues de 5 dias

ANTICONCEPTIVOS



- Es importante una vez finalizado el proceso y el posterior sangrado a un aborto realizarse una ecografía de rutina para confirmar el aborto fue exitoso y no queda tejido gestacional.
- Acuda con un ginecólogo de confianza y solicite un nuevo anticonceptivo que sea mas efectivo en su organismo, investigar distintos tipos que hay en el mercado y elegir el que se ajuste a sus necesidades.
- Existen inyecciones, implantes, pastillas, parches, anillos, etc..





MÁS INFORMACIÓN

+569 51390532

compramisotrol.com

cytotecchile18@gmail.com